

Fall 1: Eine junge Frau mit starker Regelblutung



Anamnese, Symptome:

Eine 22 Jahre alte Patientin kommt zur Abklärung einer seit längerem bestehender Blutungsneigung

- Seit der Kindheit Neigung zu Hämatomen, spontan und nach Verletzungen
- Immer wieder Nasenbluten
- Früher starke Regelblutung, seit Beginn mit Pille nun normal
- Nachblutung nach Weisheitszahn-Extraktion

Blutungsmuster:

Art der Blutung	wann	Schweregrad	Blutungs-Behandlung
Nasenbluten	Seit Kindheit	Leicht	keine
Haut-Hämatome	Seit Kindheit	Leicht, spontan und induziert	keine
Nachblutung nach Verletzungen	Seit Kindheit		
Mundschleimhaut	Nein		
Gastrointestinaltrakt	Nein		
Hämaturie	Nein		
Zahnextraktionen	Vor 2 J	Weisheitszahn, Nachblutung	Tamponade, Übernähung
Operationen	Nein		
Starke Regelblutung	Seit Menarche	6 Tage, stark	Eisen
Postpartale Blutungen	Nein		
Muskelblutungen	Nein		
Gelenksblutungen	Nein		
Intrazerebrale Blutungen	Nein		
Andere Blutungen	Nein		

Siehe auch: ISTH-Bleeding Assessment Tool (<https://bleedingscore.certe.nl/>)

Familienanamnese: unbekannt

Klinischer Status: einige kleine Hämatome DM-2 cm an beiden Oberschenkeln und li. Oberarm

Medikamente/Indikation: keine

Laborwerte:

Parameter	Ergebnis		Normalbereich
Prothrombinzeit (%)	85		80-140
APTT (Sek.)	40		27-41
Thrombinzeit (Sek.)	17		<21
Anti-Xa (U/mL)	0,1		<0,1
Fibrinogen (g/dL)	3,4		2,0-4,0
PFA 100 Epi (Sek.)	200	H	82-150
PFA 100 ADP (Sek.)	80		62-100
Von Willebrand Faktor: Ag (%)	52	L	60-180
Von Willebrand Faktor: Akt (%)	44	L	48-170
Faktor II:Akt. (%)	-		75-130
Faktor V:Akt. (%)	-		75-130
Faktor VII:Akt. (%)	-		75-160
Faktor VIII:Akt. (%)	65		60-230
Faktor IX:Akt. (%)	-		60-140
Faktor X:Akt. (%)	-		70-150
Faktor XI:Akt. (%)	-		60-140
Faktor XII:Akt. (%)	-		60-140
Faktor XIII:Akt. (%)	-		70-140
Tauschversuch	-		neg
Thrombozyten (G/L)	-		150-350
Blutgruppe	unbekannt		

Auflösung:

Leichtes von Willebrand Syndrom Typ 1